

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類 医薬品 で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンAD製剤

目の乾燥感の緩和、ビタミンA・Dの補給に

ノアールADチュアブル

水なしで服用できるオレンジ味のチュアブル錠

ノアールADチュアブルは…

- ●パソコン・OA機器や車の運転などによる目の乾燥感を緩和するビタミンAを配合しています。
- ●ビタミンD3、沈降炭酸カルシウムを配合し、発育期のお子様、骨や歯を丈夫 に保ちたい方に適しています。
- ●7才のお子様から服用できます。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人。

(妊娠 3π 月前から妊娠 3π 月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告があります。)

- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に ご相談ください
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	かゆみ
消化器	悪心•嘔吐

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
- 3.次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

下痢

〔効 能〕

- ●目の乾燥感の緩和 ●骨歯の発育不良 ●夜盲症(とり目) ●くる病の予防
- 次の場合のビタミンADの補給:発育期、老年期、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期



〔用法·用量〕

下記の1回服用量をかみくだくか、又は口中でとかして服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数	
大人(15才以上)	2錠	20	
7~14才	1錠	20	
7 才未満	服用しないでください		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量と働き] 4錠中

成 分	分 量	働き		
ビタミンA	4,0001.U.	目と粘膜を健康に保ち、また、軟骨・骨の成長 にも効果をあらわします。		
ビタミンD3	400ı.U.	カルシウムの吸収を助け、骨の発育を促進します。		
ビタミンC	200 mg	身体のエネルギー代謝に関与し、体力低下間		
ビタミンCナトリウム	56.24mg	などに効果をあらわします。		
沈降炭酸カルシウム	100mg	骨や歯の形成維持に効果をあらわします。		

※I.U.は国際単位。

添加物として、白糖、乳糖、エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロ-ス、ステアリン酸Mg、黄色5号、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して 保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

(ビタミンの知識)

- ■ビタミンAは皮膚や粘膜を丈夫にし、目や消化器、呼吸器を健康に保つ働き があります。また、目の網膜細胞(特に光を感じる組織)をつくるのに役立 ち、正常な視覚を維持する働きがあります。
 - ビタミンAはうなぎ、レバー、かぼちゃ、にんじんなどの食品に多く含まれ ています。
- ビタミンDはカルシウムの吸収と密接な関係をもち、骨や歯を丈夫に保ち ます。また、ビタミンAの吸収を助けます。
 - ビタミンDは日にあたることにより人間の体内でつくることができます。 食品では魚の肝油の中に多く含まれています。日にあたる機会の少ない人 や魚の嫌いな人はビタミンDが不足しやすいので注意しましょう。

☆ビタミンAとDは体の中にためておくことができるビタミンです。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。 佐藤製業株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

08075