



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬

目の疲れ・結膜充血に

ノアール[®] クール

塩酸ナファゾリン配合、清涼感タイプ

ノアールクールは…

- さわやかな清涼感のある無色澄明な目薬です。
- 結膜充血、紫外線などによる目の炎症に効果をあらわす塩酸ナファゾリン、グリチルリチン酸二カリウムを配合しています。
- 目の調節機能や代謝機能を高め、目の疲れに効果をあらわすメチル硫酸ネオスチグミン、L-アスパラギン酸カリウムを配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ


- (2)目のかすみ改善されない場合
- (3)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

キャップの開閉方法 必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。

●開け方


キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)



●閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



〔効 能〕

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕 15mL 中

成 分	分 量	働 き
塩酸ナファゾリン	0.3mg	血管収縮作用により、目の充血に効果をあらわします。
メチル硫酸ネオスチグミン	0.75mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目の疲れに効果をあらわします。
マレイン酸クロルフェニラミン	3mg	目のかゆみ、結膜充血などのアレルギー症状を抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	7.5mg	紫外線などによる目の炎症、結膜充血、まぶたのただれを抑えます。
L-アスパラギン酸カリウム	43.5mg	眼組織の新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。

添加物として、*d,l*-カンフル、*l*-メントール、リュウノウ、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アミノカブロン酸、pH調整剤、等張化剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号