



* 2012年4月改訂(リスク区分変更および記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ロクミンゴールド

薬用人参配合 八味丸製剤

特 徴

第2類医薬品*

- 漢方処方「八味丸」に薬用人参を加えた生薬末で、中高年になるとおこりがちな倦怠感、肩こり、腰痛、頻尿、口渴などの症状にすぐれた効果をあらわします。
- 特有の香味をもったのみやすい、かつ色～暗かつ色の細粒状の製剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	のぼせ、動悸

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

疲れやすく、手足が冷えやすく、尿量減少または多尿で時に口渴がある次の諸症

- 倦怠感、肩こり
- 腰痛、下肢痛、しびれ
- 頻尿、排尿困難、むくみ
- 老人のかすみ目、かゆみ

(裏面へ続く)

用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15歳以上	1 包	3 回
15歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守すること。

成 分


3包(3.6g、1日服用量)中に次の成分を含有する。

八味丸		3,000mg
〔ジオウ	800mg	ブクリョウ.....400mg
サンシュユ	400mg	ボタンピ.....400mg
サンヤク	400mg	ケイヒ.....133mg
〔タクシャ	400mg	ブシ末.....67mg〕
ニンジン末		400mg
添加物：アルファー化デンプン、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン		

＜成分に関連する注意＞
生薬を用いた製品なので、製品により末の色調、形状が多少異なることがあります、効果にはかわりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



1. 八味丸は中国の後漢時代(西暦200年頃)に編集された代表的な漢方医学書「金匱要略」に収録されている処方で、疲れやすい、手足が冷えやすい、頻尿、口渴などの症状に用いられています。
2. 人参は神農本草経に収録されている重要な生薬の1つで、胃腸虚弱などによる新陳代謝機能の低下を改善し、強壮作用があるので、倦怠感などに用いられています。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号