



パウチでエコ

ロート製薬



第2類医薬品

脂肪を分解・燃焼して、溜まった
おなかの脂肪を落とす
周りの脂肪を落とす

体質研究から生まれた医薬品



〈販売名〉ロート防風通聖散錠 (ほふうつうせいさんじょう)
(しょうせんとくじょう)

体力充実して

腹部に皮下脂肪が多い方の…

✓ 肥満症

✓ 便秘 (肥満に伴う)

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

漢方製剤

【効能・効果】 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う 動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人） (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる

- (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合。
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。下痢

【用法・用量】 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

成人（15才以上）…1回3錠、7才以上15才未満…1回2錠、7才未満…服用しないこと※食間とは、食後2～3時間を指す。

＜用法・用量に関連する注意＞(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 9錠中 防風通聖散料乾燥エキス3.0g（キキョウ1.2g、ビャクジュツ1.2g、カンゾウ1.2g、オウゴン1.2g、セッコウ1.2g、ダイオウ0.9g、トウキ0.72g、シャクヤク0.72g、センキュウ0.72g、サンシシ0.72g、レンギョウ0.72g、ハッカ0.72g、ケイガイ0.72g、ボウフウ0.72g、マオウ0.72g、ショウキョウ0.24g、カッセキ1.8g、ボウショウ0.9gより抽出）を含む。添加物として、乳糖、バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、タルク、カルナウバロウを含む。※本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

製造販売元： **〇ート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク：06-6758-1230