

第②類医薬品

総合かぜ薬

# コルゲン<sup>ユー</sup>IB透明カプセル

本剤は、のどの痛みや発熱などのつらいかぜ症状の原因となる「炎症」に対し、すぐれた効果をあらわすイブプロフェンなどの6つの成分を全て“液状”に溶かし込んでカプセルに閉じ込めたお薬です。おのみになりますと、いち早く溶け出し、液状イブプロフェンがのどの痛みや発熱などに効きめをあらわすとともに、溶かし込んだ各液状成分が働いて、かぜのつらい諸症状がやわらぎ、体がラクになってまいります。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがあります。）

#### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 5. 服用時は飲酒しないでください

#### 6. 5日間を超えて服用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
- (8) 次の病気にかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                         |
|-------|-----------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ                   |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、胸やけ、口内炎 |
| 精神神経系 | めまい                         |
| その他   | 目のかすみ、耳なり、排尿困難、むくみ          |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称          | 症 状                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック（アナフィラキシー） | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。 |

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。                                                              |
| 肝機能障害                                        | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。                                                                                 |
| 腎障害                                          | 尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。                                                             |
| 無菌性髄膜炎                                       | 首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）                   |
| 間質性肺炎                                        | 空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。） |
| ぜんそく                                         |                                                                                                                |

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

（特に熱が3日以上続いたり、また熱が反復したりするとき）

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、下痢、口のかわき

**効能・効果** かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

**用法・用量** 下記の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15歳以上） | 2カプセル   | 3回     |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |        |



**<用法・用量に関連する注意>** (1)用法・用量を厳守してください。(2)カプセルの取り出し方：上図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

**成分・分量（6カプセル中）** ●イブuproフェン 450mg ●*d*-クロロフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg ●ジヒドロコデインリン酸塩 24mg ●グアイフェネシン 250mg ●*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg ●無水カフェイン 40mg〔添加物〕*l*-メントール、ポビドン、マクロゴール、ゼラチン、グリセリン、黄色五号、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

**保管及び取扱い上の注意** (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）(4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のカプセルが変形しないように、保管及び携帯に注意してください。(5)使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター へ  
お願いします。 ☎103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興 和 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14