

のどの痛み・はれ・あれ・不快感・声がれに

口腔咽喉薬

新コルゲンョットローチ

最近、かぜだけでなく、空気の乾燥や排気ガス、それにカラオケなどでノドを痛めたりノドの具合が悪くなるケースが増えています。

「ノドが痛い」「はれている」といった状態は、ノドが炎症をおこしている場合が多く、これをそのままにしておくと、細菌感染をおこしやすくなり、さらに炎症が悪化してしまいます。

新コルゲンョットローチは、単にノドの炎症をおさえるだけでなく、炎症が悪化しないようにしますので、ノドの痛みやはれ、声がれなどの症状にすぐれた効きめをあらわします。

ノドにきたら、新コルゲンョットローチをお口の中のかまずにゆっくり溶かして使用してください。

△ 使用上の注意**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

用法・用量

下記の量を口の中であまらずにできるだけゆっくり溶かして用いること。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4～5回
小児(5歳以上15歳未満)	1個	2～3回
5歳未満の幼児	使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)かみ砕いたり、のみ込んだりしないこと。
- (4)トローチの取り出し方:

右図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



成分・分量(5個中)

成分・分量	働 き
グリチルリチン酸二カリウム 15.0mg	消炎剤2成分の同時配合により、のどの炎症を抑え、痛みやはれをしずめます。
リゾチーム塩酸塩 37.5mg(力価)	
塩化セチルピリジニウム 5.0mg	炎症が悪化しないように、口やのどを殺菌・消毒します。
セネガ乾燥エキスを (原生薬換算量 セネガとして 400mg)	のどの粘液分泌を増加させる生薬成分です。

[添加物] ブドウ糖、白糖、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色五号、デキストリン、L-メントール、香料、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

本剤には生薬が配合されているので、製品により色が多少異なることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身のトローチが破損しないように、保管及び携帯に注意すること。
- (5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

Y1301R
18K
80110D

