

BUFFERIN

お子さまの鼻炎の諸症状の緩和に。

鼻炎薬

キッズ バファリン 鼻炎シロップS

バファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の有効成分はアセチルサリチル酸（アスピリン）ではありません。
医師、薬剤師に相談する場合は、非アスピリン製剤とお伝えください。

「キッズバファリン鼻炎シロップS」は、3ヵ月から11才未満までのお子さま用のシロップタイプの鼻炎用内服薬です。
2種類の有効成分（クロルフェニラミンマレイン酸塩、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩）と自然の生薬（サイシン流エキス）が
急性鼻炎や花粉などのアレルギー性鼻炎の諸症状を緩和します。

- お子さまの大切な眠りをさまたげない、ノンカフェイン処方です。
- クロルフェニラミンマレイン酸塩がくしゃみ、鼻みず、鼻づまりをやわらげます。
- *dl*-メチルエフェドリン塩酸塩が鼻粘膜の充血・腫れをおさえ、鼻づまりをしずめます。
- アレルギー性の鼻炎にも効果があります。
- 自然の生薬（サイシン流エキス）がやさしく作用し、鼻みず、鼻づまりなどの症状をやわらげます。
- 小さなお子さまでものみやすい、いちご味のシロップです。
- お子さまの誤飲を防ぐ、安全キャップを採用しています。
- コデイン（麻薬成分）を含んでいません。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

（必ず裏面もお読みください）

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量


次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。
場合により約4時間の間隔を置いて、1日6回まで服用して差し支えありません。

年 齢	7歳以上 11歳未満	3歳以上 7歳未満	1歳以上 3歳未満	6か月以上 1歳未満	3か月以上 6か月未満	3か月未満
1回量	10mL	6mL	5mL	4mL	3mL	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>


- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

●1回の服用量



●注ぎ方

計量カップのフチにボトルの口をあてて注いでください。ボトルを離して注ぐと、ボトルの口もとにシロップがたれ、それが固まるとキャップが開かなくなることがあります。



成 分 (60mL中)

有効成分	含 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどのアレルギー症状をやわらげます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	55mg	鼻粘膜の充血・はれを押さえ、鼻づまりをしずめます
サイシン流エキス（原生薬換算量 0.2g）	0.2mL	抗アレルギー作用により、鼻みず・鼻づまりなどの症状をやわらげます

添加物として白糖、カラメル、グリセリン、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、エチルバニリン、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 計量カップは、使用後水洗いなどして、清潔に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 本品には生薬エキスが配合されているため、まれに微湿濁が生じる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (7) キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯（50～60℃）に2～3分つけると開けやすくなります。

安全キャップの使用法

■計量カップ

計量カップをはずしてから、お使いください。



■安全キャップのあけ方

①キャップを強く押しながらか、②矢印の方向に回してあけます。

※テーブルの上に置いて上から押すと、力を入れやすくなります。

■安全キャップのしめ方

ボトルの口の周囲をよく拭いてから、普通のキャップをしめる要領でしっかりとめてください。



■お問い合わせ先 ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

■ホームページアドレス www.bufferin.net/ 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。