

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃もたれ・胃の痛み・飲みすぎに効く  
セトラキサート塩酸塩配合

第2類医薬品  
制酸薬

## 新センロック錠 Senlock®

### 特 徴

- 胃粘膜の血流を改善して、荒れた粘膜を修復するセトラキサート塩酸塩を配合しています。
- 胃の痛みやけいれんを抑えるロートエキスを配合しています。
- アルミニウム及びナトリウムを含んだ制酸剤は配合されていません。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい  
フェニルケトン尿症の人  
(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため)
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(6) 次の症状のある人  
排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人  
腎臓病、心臓病、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状         |
|------|-------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器  | はきけ、胃・腹部膨満感 |

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい  
口のかわき、便秘、下痢

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

## 効能・効果

胃もたれ、胃の痛み、飲みすぎ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、胸やけ、げっぷ、はきけ（むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、胃酸過多



胃もたれ



胃の痛み



飲みすぎ



胸やけ

## 用法・用量

次の量を食間又は就寝前に服用して下さい。

| 年 齢       | 1回量       | 1日服用回数 |
|-----------|-----------|--------|
| 成人（15歳以上） | 3錠        | 3回     |
| 15歳未満     | 服用しないで下さい |        |

（食間とは、食事の約2時間後をいいます。）



朝食の約2時間後に



昼食の約2時間後に



夕食の約2時間後  
又はおやすみに

### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守して下さい。

## 成 分

1日量（9錠）中

| 成 分                          | 含 量     | 作 用                     |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| セトラキサート塩酸塩                   | 600mg   | 胃粘膜の血流を増やして、荒れた胃粘膜を修復する |
| ロートエキス3倍散<br>（ロートエキスとして30mg） | 90mg    | 胃の痛みやけいれんを鎮め、胃液の分泌も抑える  |
| 沈降炭酸カルシウム                    | 1,200mg | 出過ぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげる  |
| 水酸化マグネシウム                    | 300mg   |                         |

添加物：バレイショデンプン、エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、L-メントール、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。  
なお、服用のつどビンの中をしっかりと振して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) ビンの中のつめものはフタを開けた後は、取り除いて下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、一度開封した後は、品質保持の点から6カ月以内に服用して下さい。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記に  
お願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

® 登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開港277番10