

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

化膿性皮膚疾患用薬

第2類医薬品

けが等の化膿予防及び治療、おでき(せつ、ちょう)に

ドルマイシン[®]軟膏

(コリスチン硫酸塩・バシトラシン軟膏)

〔特 徴〕

コリスチンは、*Bacillus polymyxa* var. *colistin*の培養液から抽出精製された白色結晶性の粉末です。その抗菌作用はグラム陰性菌に対し選択的に作用し、殺菌作用を発揮します。また、緑膿菌に対しても効果を発揮します。

バシトラシンは、菌種*Bacillus subtilis* var. *Tracy*の培養液より抽出された白色～淡褐色の粉末で、ペニシリンと近似の抗菌スペクトルを有し、大部分のグラム陽性菌と陰性菌の一部に奏効します。

ドルマイシン軟膏はこれら殺菌作用をもつ両抗生物質を配合し、グラム陽性・陰性菌による単独又は混合感染症はもちろん、一般外部疾患の感染予防並びに治療に効果を発揮する皮膚疾患治療剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 湿潤、ただれのひどい患部。
- (2) 深い傷、ひどいやけどの患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 鼻腔等の粘膜に病変のある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

(必ず裏面もお読みください)



〔効能・効果〕

外傷・火傷等の化膿予防及び治療、膿疱疹(とびひ)、癬(せつ)、癰(よう)、疔(ちょう)、毛囊炎、湿疹、グラム陽性・陰性菌の単独及び混合感染による皮膚疾患、化膿症、伝染性皮膚炎、皮膚潰瘍

〔用法・用量〕

通常1日1～3回、適量を患部に直接又はガーゼに塗布して用いてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

〔成 分〕 1g中

コリスチン硫酸塩(硫酸コリマイシン)……………50000 単位
バシトラシン……………250 単位
添加物として、白色ワセリン及び流動パラフィンを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080(ダイヤルイン)
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11



KB D08N
ドルマイシン軟膏