

## 第2類医薬品

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。  
必要時に読めるように大切に保管すること。

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎等の諸症状の緩和に

# プレコール®持続性 鼻炎カプセルL

塩酸プソイドエフェドリン配合鼻炎用内服薬

1日2回朝・夜服用



### 〔プレコール持続性鼻炎カプセルLの特徴〕

1. 朝・夕1日2回だけの服用で優れた効果を発揮する持続性カプセルです。
2. 5つの成分がづらい急性鼻炎やアレルギー性鼻炎等の諸症状に効果を発揮します。
3. 塩酸プソイドエフェドリンが鼻粘膜の充血やはれをおさえ鼻づまりを改善します。

### ⚠〔使用上の注意〕



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難  
(3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去たん薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去たん薬）
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）
4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人：高熱、排尿困難、むくみ  
(7) 次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病  
(8) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
そ の 他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください 口のかわき、便秘

### 【効能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

### 【用法・用量】

次の量を、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル	2回 (朝・夕)
7歳～15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないこと	

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



### 【成分・分量】

本剤は、淡緑色と白色のカプセルで、4カプセル中に次の成分を含有する。

成分	含有量	働き
塩酸プソイドエフェドリン	120mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえて鼻づまりを改善する。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	アレルギー症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目)をおさえる。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	分泌抑制作用により鼻水やなみだ目をおさえる。
グリチルリチン酸	45mg	炎症をおさえ、鼻炎の症状を緩和する。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげる。

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、青色1号、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

### 【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、  
または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 03(5205)8331  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9-2