

湿疹、皮ふ炎
治療薬

リビメックスコーワクリーム

リビメックスコーワは、OTC医薬品として初めて導入されたアンテドラッグと呼ばれるステロイド外用薬です。

アンテドラッグとは、塗布した患部で皮ふの炎症によく効き、体内で低活性物質に変わるタイプの薬剤です。お使いになりますと、有効成分が湿疹、皮ふ炎、かぶれなどの炎症を抑え、すぐれた効きめをあらわします。



リビメックスコーワは、身近なご家庭で、より適切に湿疹、皮ふ炎、かぶれなどの手当てができるすぐれた皮ふ病のお薬であります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が広範囲の人。
- (6) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
吉草酸酢酸プレドニゾロン1.5mg	炎症患部でよく効き、体内で低活性に変わるアンテドラッグ・ステロイド成分で、湿疹、皮膚炎、じんましん等の炎症を鎮めます。

〔添加物〕ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、パラベン、エデト酸Na、クエン酸、水酸化Na

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。



保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造 興 和 株 式 會 社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14