



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬

お子さまの目のつかれ・眼病予防に

こどもノアール®

こどもノアールは…

- 目の調節機能を高め、目のつかれに効果をあらわす、メチル硫酸ネオスチグミンを配合しています。
テレビ、テレビゲーム、勉強などで目がつかれたときにお使いください。
- 水泳のあとや外で遊んで汗やほりが目に入ったときなどの眼病予防に効果をあらわします。
- 結膜充血、目のかゆみなどに効果をあらわす、グリチルリチン酸二カリウム、マレイン酸クロルフェニラミンを配合しています。
- お子さまの目に刺激の少ない、無色澄明な目薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)2週間位使用しても症状がよくなる場合


キャップの開閉方法

必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。

●開け方


キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)



●閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



〔効 能〕

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、目のかゆみ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

〔用法・用量〕

15才未満、1日3～6回、1回2～3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕 15mL 中

成 分	分量	働 き
メチル硫酸ネオスチグミン	0.3mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目のつかれに効果をあらわします。
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	結膜充血、紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。
マレイン酸 クロルフェニラミン	3mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギーによる目のかゆみ、結膜充血を抑えます。

添加物として、塩化ベンザルコニウム、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、pH調整剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中（ダッシュボード等）や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号