

点眼薬
紫外線による目の炎症、充血、瞼のただれに

ノアルUV

ノアルUVは…

- 新陳代謝を促進し、光線による眼炎に効果をあらわすフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(FAD)を配合した黄色の透明な目薬です。
- イプシロン-アミノカプロン酸の抗プラスミン作用により目の炎症を抑えます。
- 末梢血管の血流をよくして目の疲れを改善する天然型ビタミンEを配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみが改善されない場合

(3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

【効 能】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】

1日3～6回、1回1～3滴点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕15mL中

成 分	分 量	働 き
フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム (FAD)	7.5mg	新陳代謝を促進し、光線による眼炎に効果をあらわします。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	7.5mg	末梢血管の血流をよくして目の疲れを改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	150mg	抗プラスミン作用により目の炎症を抑えます。
マレイン酸クロルフェニラミン	1.5mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギーによる目のかゆみ、充血を抑えます。
メチル硫酸ネオスチグミン	0.75mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目の疲れに効果をあらわします。
L-アスパラギン酸カリウム	34.5mg	眼組織の新陳代謝を整え、目の疲れに効果をあらわします。

添加物として、*m*-カンフル、*l*-メントール、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、等張化剤、ホウ酸、pH調整剤を含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 添付の携帯袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウムは光に当たると分解して退色します。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (7) 本剤は、黄色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときはすぐに水で洗い流していただければシミになりません。
- (8) 容器のネジ部に成分の黄色い結晶がつくことがありますが、このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお電話申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間: 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号