

みずむし・たむし用薬
ハイベチックUゼリー[®]

トルナフテート、ウンデシレン酸配合

ハイベチックUゼリーは…

- トルナフテート、ウンデシレン酸配合でみずむし・たむしにすぐれた効きめがあります。
- 清涼感があり、かゆみを抑えるクロタミトン、ジフェンヒドラミンを配合しています。
- さっぱりとした使用感で、浸透力のよい透明のゼリーです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください


- (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)乳幼児。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)患部が顔面又は広範囲の人。
 - (6)患部が化膿している人。
 - (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
- (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

(2)2週間位使用しても症状がよくなる場合



【効 能】

みずむし、ぜにたむし、いんきんたむし

【用法・用量】

1日2～3回患部を清浄にした後、適量を塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
トルナフテート	1%	みずむし・たむしの原因である白癬菌に対して、抗菌作用・発育阻害作用をあらわします。
ウンデシレン酸	3%	
クロタミトン	5%	みずむし・たむしの炎症、かゆみを抑えます。
ジフェニヒドラミン	1%	
グリチルレチン酸	0.3%	
l-メントール	2%	

添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、没食子酸プロピル、クエン酸、1,3-ブチレングリコール、メチルエチルケトン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



水虫、いんきんたむし、ぜにたむしは白癬菌というカビの一種が皮膚に寄生することによって起こる症状です。足に感染すると一般に「水虫」、陰股部に感染すると「いんきんたむし」、体部に感染すると「ぜにたむし」と呼ばれ、一般的にかゆみをともないます。かゆみのためにかきこわして化膿菌の二次感染を起こし悪化することがありますので早めのお手当が必要です。

●水虫の上手なお手当

1. **清潔** 患部は常に清潔にしてください。
入浴の際は刺激の少ない石鹸を使いましょう。
2. **乾燥** 患部のむれを予防し乾燥に心がけましょう。
白癬菌は、じめじめした環境を好みます。スポーツなどで汗をかいたあとや入浴のあとには、タオルで患部を十分にふいて乾燥させることを心がけてください。くつしたは木綿のものをはきましょう。
3. **根気** かゆみなどの症状がとれても白癬菌が死滅していないことが多く、途中で治療を中止してしまうと再発の原因になります。かゆみなどがとれたあとも、しばらくの間根気よく治療を続けてください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号