

●使用上の注意

【直読するタイプ】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

【副作用】
嘔吐、下痢、発疹等

(2)しばらく服用しても症状がよくなりえない場合

●保管及び取扱い上の注意

(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

●用法・用量／大人(15歳以上) 1回1瓶、1日1回

服用してください。

(用法・用量に関する注意)

用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含む

する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等

に注意してください。)

■生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることが

あります。

■リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が

黄色になることがあります。



50mL

お問い合わせ先 03-3279-7755

ガラス：瓶 金属：キャップ

製造販売元 興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造 滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町 滝 879

使用期限

製造番号 TOS

Kowa

指定医薬部外品

ビタミン含有保健剤

新三オD_{コフ}/100

1 身体に必要な成分 (成分・分量50mL中)

チアミン硝化物(VB₁)10.0mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム(VB₂)

5.0mg ビリドキシン塩酸塩(VB₆)10.0mg ニコチン酸アミド25.0mg

2 滋養強壮によりニンニク抽出成分

オキソアミチン(ニンニク抽出成分)100.0mg

3 虚弱体質により朝鮮

人參エキスイニンゲン乾燥エキス

45.0mg (ニンジンとして672mg)

L-アルギニン塩酸塩50.0mg カフェイン水和物50.0mg

(添加物) D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、バラベン、

安息香酸Na、白糖、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン

効能・効果／滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・

栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

