

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

非ピリン系鎮痛・解熱剤

グレンエース錠

頭痛・歯痛・生理痛に

第2類医薬品

特 徴

- 頭痛・歯痛・生理痛などの痛みをやわらげ、悪寒・発熱時の解熱に対してすぐれた効果をあらわすエテンザミド、アセトアミノフェン配合の白色の錠剤です。
- 鎮痛・解熱成分に、痛みをおさえる成分の働きを助けるプロモバレリル尿素、発熱時に消耗しやすいビタミンB₁の誘導体ジベンゾイルチアミンを配合しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること

- (1)医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)本人または家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなりえない場合

効 能

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱



用法・用量

15歳以上は1回2錠、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて、水またはお湯で服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。

年 齢	1回量
15歳以上	2錠
15歳未満	服用しないこと



〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。（誤ってそのままのみこんだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる。）



成 分

2錠（1回服用量）中

成 分	含 量	はたらき
エテンザミド	500mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
アセトアミノフェン	300mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
プロモバレルリ尿素	200mg	痛みをおさえる働きを助けます。
無水カフェイン	26mg	痛みをおさえる成分の働きを助けます。
ジベンゾイルチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	10mg	痛みをおさえる成分の働きを助けます。また、発熱時に消耗しやすいビタミンB ₁ の誘導体です。

添加物：クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素カルシウム水和物

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

包 装

12錠（6錠×2）、24錠（6錠×4）

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

あすか製薬株式会社 くすり相談室

〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号 電話(03)5484-8339

受付時間：9：00～17：35（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元 **あすか製薬株式会社**

〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号

販売元 **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号