# ROHTO P 12mL

目には思いやりの心が大切です。さあ、ひと休みしましょう。

ます。 エネルギー代謝に効果的に働きかけビタミンBを含んだ有効成分が、目の黄色い一滴でブレークタイム。活性型黄の疲れを感じたら、ロートPROの目の疲れを感じたら、ロートPROの



の疲れを蓄積させてしまうようです。知らず知らずのうちに、とれにくい目TVゲームなどは、その中でも代表格。


目が疲れる原因は、社会や生活の中に

# オフィスでのパソコン作業。



睡眠不足が目の疲れを倍加します。







時々、目がしょぼしょぼします。

# 大好きなTVゲーム。



なかなか止められず、目が充血しています。





## 使用上の注意

# 相談すること



- .次の人は使用前に医師又は薬剤師に ご相談ください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)次の症状のある人…はげしい目の痛み
  - (5)次の診断を受けた人…緑内障

- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この 説明書を持って医師又は薬剤師にご相 談ください。
  - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)5~6日間使用しても症状がよくな らない場合

### 効能・効果

目の疲れ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、 目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、目のかゆみ

#### 用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

#### 用法・用量に関連する注意

- 1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますの で用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて ください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物 混入(目やにやホコリ等)の原因となる)また、混濁したものは使用し ないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみご使用ください。



#### 有効成分

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(活性型ビタミンB2)・・・0.05%	アミノエチルスルホン酸1%
塩酸ピリドキシン(ビタミンBe)···········0.1%	塩酸ナファゾリン0.003%
L-アスパラギン酸カリウム ·······1%	
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ℓ-メントール、ユーナ	
塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、エデト酸	Na、ボリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール
を含有します。	

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、 自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であ っても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。 その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってご使用ください。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないでください。
- ※薬剤の黄色は衣服についた場合、多少、落ちにくいかと思われます。あらかじめご注意ください。

#### お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご お聞かせいただけませんか。「あなたに「 えたい」サポートデスクです

大阪:06-6758-1230 東京:03-5442-6020

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く

