

この説明文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

皮膚疾患治療薬

オイラックス[®]PZ軟膏

オイラックスPZ軟膏の特徴

1. プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグとよばれる副腎皮質ホルモン（ステロイド）で、しっしん、皮膚炎、じんましん等の炎症をしずめます。
「アンテドラッグ」とは
皮膚表面の患部で効果をあらわし、吸収されると低活性になる特性をもつ薬剤です。
2. 鎮痒剤クロタミトンが、しっしん、かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
3. トコフェロール酢酸エステルが血行を促進し、治癒を促します。
4. 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。
5. 油性の基剤を使用していますので、じゅくじゅくした症状からカサカサの皮膚まで幅広く使用できます。また、患部を保護するはたらきもあります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等または化膿している患部。
(2) 目、口唇等の粘膜の部分や目の周囲。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が広範囲の人。
(6) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果


しっしん、皮膚炎、じんましん、かぶれ、あせも、かゆみ、虫さされ、ただれ

使用法

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 使用部位をラップフィルム等の通気性のわるいもので覆わないでください。
- (5) チューブの開け方
キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差込み、穴を開けてください。

チューブの正しい開け方



＜主成分名・含量＞の並びと＜成分・分量＞の並びは、＜使用上の注意＞の表を参照してください。


本剤は、白色～淡黄色の軟膏で、1g中に次の成分を含有する。

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg
クロタミトン	50mg
トコフェロール酢酸エステル	5mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg
添加物：パラフィン、ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ソルビタンセスキオレイン酸エステル	

塗擦後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168