

みずむし・たむし用薬

ピロエスW[®] パウダー スプレー

抗生物質

+

抗真菌剤

+

鎮痒剤

配合
70g

第2類医薬品



Daichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと

＜使用上の注意＞



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等 (2)しっしん (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人 (2)乳幼児 (3)本人または家族がアレルギー体質の人 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)患部が広範囲の人 (6)患部が化膿している人 (7)「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、げにたむし」かがかきつけない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ

(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

(3)使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれ、化膿したり、病巣が使用前より広がる等)

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

火気厳禁 第一石油類 10mL (登録商標)

ピロエスWパウダースプレー 第2類医薬品

＜効 能＞ みずむし、いんきんたむし、げにたむし

＜使用法＞ 1日2～3回、適量を患部に噴霧してください

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください (2)目に入らないように注意してください (3)万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください (5)外用にのみ使用してください (6)患部まで約10cmの距離で噴霧してください (7)凍傷になる恐れがありますので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないでください (8)内容物の残量が少なくなったときに、缶を横向きの状態で使用すると、出にくくなる場合があります

よく振ってから使用してください

＜成分・分量＞ 70g中 ピロールニトリン20mg(力価)、クロトリマゾール40mg、クロタミン500mg、L-メントール100mg 添加物：ソルビトールセスキオレイン酸エステル、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、酸化チタン、ジシプロパノールアミン、エタノール、LPG 本剤はアルコールを含んでいますので噴霧時にしめることがあります

＜保管および取扱上の注意＞

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)火気に近づけないでください (4)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください (5)缶底に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください (6)捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください

使用期限、製造番号は缶底記載

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234

東京都中央区日本橋3-14-10

お客様相談室 03(5205)8331

ホームページ

<http://www.daichisankyo-hc.co.jp/>

キャップ(PP)

外装

フィルム(PP)



缶：金属



4