

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

のどのはれ、のどの痛み、口内炎に

第3類医薬品

口腔・咽喉用薬



ペラック[®]T錠

トラネキサム酸配合

特 徴

ペラックT錠は、炎症やアレルギーを抑える作用のあるトラネキサム酸、カンゾウ乾燥エキスの他に、タンパク質や脂質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の機能を正常に働かせるビタミンB₂、ビタミンB₆と体力消耗に効果のあるビタミンCの3種のビタミンを配合した薬です。

空気の乾燥・汚れやかぜなどからくるのどの炎症である咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）および口内の炎症である口内炎によく効き、7歳の小児から成人まで服用できる薬です。

●トラネキサム酸配合

炎症やアレルギーを抑える作用のあるトラネキサム酸を、1日量あたり750mg配合しています。

●のどのはれ、のどの痛みにすぐれた効果

トラネキサム酸とカンゾウ乾燥エキスの2つの成分が有効に作用して、口内およびのどの炎症を抑えます。

●眠くならない医薬品

抗ヒスタミン薬を配合していませんので、眠くなりません。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

- (1) 甘草（カンゾウ）またはその主成分グリチルリチン含有する内服薬（むくみ、血圧上昇および筋疾患（ミオパシー）等が起こることがある。）
- (2) 他のアレルギー用薬、トラネキサム酸含有する内服薬（鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬）

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

下痢

効能・効果

咽頭炎・扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)、口内炎

用法・用量


次の量を水またはお湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回(朝昼晩)
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまわない。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (4) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)

〈錠剤の取り出し図〉



成分・分量

成人1日量(6錠)中

成 分	分 量	はたらき
トラネキサム酸	750mg	炎症やアレルギー症状が起こっているとき、体内で異常増加している酵素(プラスミン)を抑え、口内やのどにおけるはれ、痛みなどの症状を改善する。
カンゾウ乾燥エキス	198mg (原生薬として990mg)	生薬、甘草のエキスで、主成分のグリチルリチン酸は、炎症やアレルギーを抑える作用がある。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	皮膚や粘膜の機能を正常に働かせる作用がある。
リボフラビン (ビタミンB ₂)	12mg	
L-アスコルビン酸ナトリウム (ビタミンCナトリウム)	500mg	体力消耗に効果がある。

添加物：セルロース、無水ケイ酸、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、プロピレングリコール、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、黄色三酸化鉄、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがある。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限は外装に記載してあるので、使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、一度開封した後は、品質保持の点から開封後より6か月以内に服用すること。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入すること。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地

®登録商標