

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面およびビンラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないこと

血中の脂質に **ドルチトル** (コレステロール)

第3類医薬品

販売名:ドルチトル

血清高コレステロール改善薬

製品特徴

ドルチトルは、血中の脂質※が気になる方や、
血中の脂質※が多く、血流がスムーズでない方
に適しています

- 血中の脂質※を減らして、スムーズな流れにします
- 2つの働きのある有効成分「リボフラビン酪酸エステル」が、血中の脂質※を減らします
 - ① 血中の脂質※が余分に作られることを抑える
 - ② 余分な血中の脂質※を体外へ排出する
- 1日2回の服用で効いていきます
- 飲みやすい小粒の錠剤です

※血中の脂質とは、コレステロールのことです

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、悪心・嘔吐、胸やけ

- (2) しばらく(1ヶ月位)服用しても症状がよくなりません
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
○下痢

効能・効果 血清高コレステロールの改善

用法・用量 次の量を、食後に水または白湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	2回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

○定められた用法・用量を厳守すること

成分・分量 1日量(4錠)中

成分	分量
リボフラビン酪酸エステル	60mg

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する

●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものですから

心配ありません●本剤に見られる小さな赤い斑点は、有効成分をそのまま成形したことによるもので、品質には問題ありません

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること(2) 小児の手の届かないところに保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 本剤をぬれた手で扱わないこと(5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること(6) 容器内の乾燥剤は服用しないこと



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

—— 製品のお問い合わせ先 ——

お客様相談室 ☎06(6203)3625

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10085785