

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

滋養強壮 肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給

ニューゼナF-Ⅲ

第2類医薬品

〈ビタミン含有保健薬〉

- ◆ニューゼナF-Ⅲは、ニクジュユウ ト シ シ肉苾蓉や菟糸子、ブラジル原産の強壮生薬ムイラプアマ等、計15種の生薬(原生薬として計4950mg)とタウリン、ビタミン等を配合したミニドリンク剤です。
- ◆体の疲れがとれない方、疲れていてもまだまだ頑張らなければならない方、かぜ等の発熱性消耗性疾患にかかり体力の衰えた方等の栄養補給にたいへん効果的です。



使用上の注意



相談すること

- ① 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って
医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

- ② 次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を
中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢



効 能

☆滋養強壮

☆虚弱体質

☆肉体疲労・発熱性消耗性疾患・食欲不振・病中病後・
栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給


こんな時に



疲れていても、もうひと
踏ん張りしなければな
らない方の栄養補給に



滋養強壮に



かぜ等の発熱で体力を
消耗している時の栄養
補給に

用法・用量

次の量を服用してください。

年 令	成人(15才以上)	15才未満
1 回量	1 本 (50mL) 	服用しないこと 
服用回数	1 日 1 回	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成 分

1本(50mL)中

ニクジュヨウ(肉苁蓉)エキス 91mg (肉苁蓉300mgに相当)	オウギ(黄耆)流エキス 0.3mL (黄耆300mgに相当)
トシシ(菟糸子)エキス 33mg (菟糸子300mgに相当)	オウセイ(黄精)流エキス 0.3mL (黄精300mgに相当)
ジャショウシ(蛇床子)エキス 600mg (蛇床子300mgに相当)	ゴミシ(五味子)流エキス 0.15mL (五味子150mgに相当)
トチュウ(杜仲)抽出液 0.3mL (杜仲300mgに相当)	オンジ(遠志)エキス-A 15mg (遠志150mgに相当)
イカリ草(淫羊藿)エキス 100mg (淫羊藿1000mgに相当)	ハンピ(反鼻)チンキ 1.75mL (反鼻350mgに相当)
ムイラブアマエキス-A 15mg (ムイラブアマ300mgに相当)	チアミン硝化物(ビタミンB ₁) 10mg
ジオウ(地黄)エキス-A 100mg (地黄200mgに相当)	リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg (ビタミンB ₂)
トウキ(当帰)流エキス 0.2mL (当帰200mgに相当)	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) 5mg
クコシ(枸杞子)流エキス-A 0.2mL (枸杞子200mgに相当)	タウリン 500mg
ニンジン(人參)エキスM 90mg (人參600mgに相当)	無水カフェイン 50mg

添加物：白糖、キシリトール、トレハロース、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、ポビドン、安息香酸Na、pH調節剤、トリカブリン、香料、アルコール (アルコール1.2mL以下)

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田 3丁目24番 1号



<http://www.taisho.co.jp/zena/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)