



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



抗菌目薬

結膜炎・ものもらいに

ノアール SG

スルファメトキサゾール
ナトリウム配合

ノアールSGは…

- 結膜炎やものもらいなどの原因菌にすぐれた抗菌作用をあらわす、持続性のサルファ剤スルファメトキサゾールナトリウムを配合した点眼薬です。
- 結膜炎やものもらいなどに伴う目の炎症を抑える、グリチルリチン酸二カリウムを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 3～4日間使用しても症状がよくならない場合




キャップの開閉方法

必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。

●開け方


キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)



●閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



【効 能】

結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、目に刺激を与えないようにご注意ください。ものもらいは体質的に起こりやすい場合があります。過労や睡眠不足など体力が低下しているときに起こりやすいので、なるべく無理をせず睡眠も十分とるように心がけてください。

【用法・用量】

1日3～6回、1回2～3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量と働き】15mL中

成 分	分 量	働 き
スルファメトキサゾール ナトリウム	600mg	結膜炎やものもらいの原因菌に抗菌作用をあらわします。
グリチルリチン酸 二カリウム	15mg	ものもらいやまぶたのただれなどの目の炎症を鎮めます。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Naを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に苦みや甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6)温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号