

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう保管して下さい。

いつまでも胃に食物が残った感じの時に

パンシロン[®]トリム〈三層錠〉

消化管運動改善剤 トリメブチンマレイン酸塩配合



弱った胃をイキイキ動かし

胃もたれ

膨満感を

スキッと軽くします

パンシロン[®]トリム〈三層錠〉は、消化管運動改善剤である

トリメブチンマレイン酸塩を配合した胃もたれ・膨満感に効果的に働く胃薬です。



食後、胃もたれる

お腹が張った感じがする

どうも胃が重い

これは、
胃がきちんと
動いていないことが
原因の一つです。

パンシロン[®]トリム〈三層錠〉は、

胃をイキイキ動かし
消化を助けるので、
胃がスキッとし
食欲がわいてきます



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)

4. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレ

ルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 ●排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。 ●腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	眠気、めまい、倦怠感、頭痛
その他	動悸、口内しびれ感、腹鳴

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意 母乳が出にくくなることがあります。

■効能・効果

もたれ（胃もたれ）、胃重、胃部膨満感、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胃部不快感、食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振（食欲減退）、胃弱、消化不良、胸つかえ、胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ（おくび）、嘔吐

■用法・用量

次の量を食後に、水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2錠	3回
15才未満	服用しないこと	

（用法・用量に関連する注意）

用法・用量を厳守して下さい。

■有効成分（1日量 6錠中）

●消化管運動改善剤	トリメブチンマレイン酸塩……………300mg	疲れて弱った胃の運動を高めて、胃の消化作用を助ける。
●制酸剤	炭酸水素ナトリウム……………300mg 沈降炭酸カルシウム……………600mg メタケイ酸アルミン酸……………240mg マグネシウム（乾燥物換算）	過剰な胃酸を中和して胃の内部のpHを整える。
	ロートエキス……………30mg	胃酸分泌を抑制し胃の内部のpHを整える。
●消化剤	ピオチアスターゼ2000……………120mg リパーゼAP6……………45mg	胃内の食物の消化を促進する。
●粘膜修復剤	カンゾウ末……………150mg	弱った胃粘膜を保護・修復する。

添加物：D-マンニトール、ポビドン、カルメロース、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール、乳糖、エチルセルロース、セルロース、二酸化ケイ素

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) めれた手で触れないで下さい。（品質が変わる）
- (5) 使用期限（外箱・瓶に記載）を過ぎた製品は服用しないで下さい。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。

■包装

50錠

お問い合わせ先：ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元 **田辺三菱製薬株式会社**
大阪市中央区北浜2-6-18