

ウエルパス 手指消毒液0.2%

ウエルパス® 手指消毒液0.2%

【薬効薬理】

1. 本剤は使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。
2. ウエルパス手指消毒液0.2%の殺菌作用
ウエルパス手指消毒液0.2%は *in vitro* の試験において、黄色ブドウ球菌、大腸菌、セラチア、緑膿菌、バクテロイデス・セピシア等の各種細菌、アスペルギルス等の真菌及び結核菌を15秒以内に殺菌した。
また、エンテロウイルスA型、単純ヘルペスウイルス1型等のウイルスに対して60秒以内に残留ウイルス力価を測定限界値以下にし、アデノウイルス8型に対しても30秒で99%を不活化した。

火気厳禁

第4類
アルコール類
水溶性
危険等級Ⅱ
エタノール

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PET

使用后、フィルムをはがしてキャップをはずした後、空容器を図のようにして折り目を外側に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません)



速乾性擦式手指消毒剤 ウエルパス® 手指消毒液0.2% WELPAS® Antiseptic Solution for Hand 0.2%

開封日

年 月 日

飲用不可

- 注意
1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。

1L

製造番号

使用期限

製造販売元

丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

ウエルパス 手指消毒液0.2%

ウエルパス® 手指消毒液0.2%

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
(2) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。
2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症	紅斑、そう痒感、浮腫等
皮膚	刺激症状

- このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
3. 適用上の注意
投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
使用時：
(1) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
(2) 血清・膿汁等の有機物は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分洗い落としてから使用すること。
(3) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
(4) 引火性、爆発性があるため、火気には十分注意すること。
(5) 本剤で消毒した手指で、2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。