第②類医薬品

生薬主剤

販売名:ロストール錠

便秘薬

# ロストール錠

## 特徵

ロストール錠はダイオウ・センナ・アロ工等の生薬主剤の便秘薬で、 おだやかな自然に近いお通じが得られます。また、活性乳酸菌(ビ オヂアスミンF-100)やビタミンB群を配合してありますので、腸内 の有害菌を取り除いたり、便秘による肌あれにも効果があります。





# 使用上の注意

# してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 3.大量に服用しないでください



# 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、悪心・嘔吐



- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤 師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ぶ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合。
- 3.次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢

#### 効能・効果

- ●便秘
- ●便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔



# 用法・用量

下記用量を朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)に服用してください。

年 齢	2~3日便通が ないとき	4日以上便通が ないとき	服用回数
15歳以上	1回3~6錠	1回6~9錠	
11歳~14歳	1回2~4錠	1回4~6錠	1000
7 歳~10歳	1回2~3錠	1回3~5錠	1820
5 歳~ 6 歳	1回1~2錠	1回2~3錠	Table Control
5歳未満	服用し	<b>しないでください</b>	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分・分量 6錠中

ダイオウ末・・・・・・・・450mg	オウゴン末・・・・・・150mg
センナ末・・・・・・・ 150mg	ケイヒ末・・・・・・ 50mg
アロエ末・・・・・・・・ 150mg	ゲンチアナ末・・・・・・50mg
イオウ・・・・・・ 100mg	塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)・・・・ 6mg
ビオヂアスミンF-100·····5mg	ニコチン酸アミド(ビタミンB3)···1.5mg
*エものもち・1で1 ノン・ニーデン・デン・ カリ カート・ノエサ A	

添加物:バレイショデンプン、タルク、ケイ酸AI、デキストリン

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分を配合しているため、製品により色が多少異なることがありますが、薬効には影響ありません。

# 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。なお、本剤は吸湿しやすい錠剤ですから、服用のつどキャップをしっかりしめてください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の 「開封年月日」 記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後 は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

#### ロストール錠を初めて服用される方に・・・

- 朝4錠とおやすみ前に4錠服用して、翌朝、便がイキまずに気持ちよく 排泄され下腹部が軽く感じたらそれが適量です。後は1日1回おやすみ 前に4錠服用してください。
- ・翌朝下痢様の便でしたら服用量を2錠~3錠に減らして、おやすみ前に のみ服用してください。
- 翌朝便の出が思わしくなかった時は朝6錠とおやすみ前に6~9錠服用してください。

翌朝には気持ちのよい便通があります。後は1日1回おやすみ前のみの服用で結構です。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社 大阪市浪速区塩草3丁目2-2