

胸やけ・胃の不快感に

医薬品

太田胃散チュアブル

噛んでスッカリ ミント風味の胃腸薬



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 次の症状のある人。
むくみ
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血 圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

特 徴

太田胃散チュアブルは、胃の調子が悪い時に、車の中、オフィス、外出先など、どこでも水なしでのめる忙しい現代生活にマッチした胃腸薬です。かみくだいたり、口の中でとがして服用してください。胸やけ、胃の不快感を取り除き、胃をスッカリさせます。また、ミント風味でほんのり甘く、服用しやすくしてあります。

効能・効果

胸やけ、胃部不快感、胃痛、胃もたれ、胃酸過多、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐、飲みすぎ

用法・用量

次の量を食前又は食間の空腹時に、かみくだくか、口の中でとがして服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 錠	3 回
15 歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間のことをいいます。

<用法・用量に関する注意>

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）




PTPシートの取り出し図


裏面に続きます

車の中、オフィス、外出先などで……

水なしでのめる



かむ、
口の中
でとかす



成 分 (1錠中)

- 合成ヒドロタルサイト (250mg)
余分な胃酸を持続的に中和しながら、
胃粘膜を保護します。
- 水酸化マグネシウム (100mg)
出過ぎた胃酸を速効的に中和します。
- グリチルリチン酸 (14mg)
荒れた胃の粘膜の炎症をしずめ、修復
します。

〔添加物〕 ℓ-メントール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、香料、銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、炭酸Mg、セルロース、ハッカ油、キシリトール

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

<日常生活でのご注意>

薬に頼るだけでなく、日頃の生活にも注意しましょう。



ストレス解消



十分な睡眠



規則的な食事



飲みすぎない

包 装

18錠 (6錠入 PTPシート×3枚)

この他、下記の姉妹品があります。目的に合わせてご利用ください。

飲みすぎ・胸やけ・胃のもたれに **太田胃散** (缶入り・分包タイプがあります)

胃のもたれ・食べすぎに小粒でのみやすい **太田胃散A<錠剤>**
ストレスによる神経性胃炎・慢性胃炎に **太田漢方胃腸薬II**
(散剤・錠剤タイプがあります)

<お問い合わせ先>

株式会社 太田胃散「お客様相談係」
電話：(03)3944-1311(代表)
受付時間 / 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2

<http://www.ohita-isan.co.jp/>