

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

ひとみ・すこやか
Santen

目の疲れ・眼病予防に

第3類医薬品

こどもサンテ[®] 目薬

テレビ、ゲーム、勉強など子どもたちを取り巻く環境には、目の疲れや炎症など不快な症状を引き起こす原因がたくさんあります。

こどもサンテは、組織代謝を活発にするビタミンB₆・タウリンや、かゆみなどの炎症を緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合し、お子様の目の疲れ・炎症に効果を発揮します。大切なお子様の目に、やさしいさし心地の**こどもサンテ**をお役立てください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
(3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.001%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	ヒスタミンのはたらきを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩)	0.1%	目の組織代謝を活発にします。
タウリン	0.1%	目の組織代謝を活発にします。

添加物として、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。



- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)他の人と共用しないでください。
(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

包 装 15mL

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 06-6321-8950
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元
参天製薬株式会社
大阪市東淀川区下新庄3-9-19
www.santen.co.jp

商品およびアイケアに関する情報は <http://hitomi-sukoyaka.com>