



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



胃腸薬
胃痛・胸やけ・胃の不快感に

イノセア チュアブル錠

胃の粘膜を守る
スクラルファート配合

イノセアチュアブル錠は…

- 傷ついた胃の粘膜を保護・修復するスクラルファートに、胃酸を中和する水酸化マグネシウムと炭酸水素ナトリウム、胃酸分泌抑制作用のあるソウジュツを配合した水なして服用できる胃腸薬です。
- ミント味のチュアブル錠です。口の中であかして服用いただければ有効成分が胃の粘膜に直接働いて、胃の不快感に効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

便秘、下痢



〔効 能〕

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を食間又は食前にかみくだくか、又は口中でとがして服用します。

年 齢	1 回服用量	1 日服用回数
大人（15 才以上）	1 錠	3 回
15 才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



〔成分・分量と働き〕 3錠中

成 分	分 量	働 き
スクラルファート	1,500mg	胃粘膜障害部に選択的に結合して荒れた胃の粘膜を保護・修復し、胃の痛みにも効果をあらわします。
水酸化マグネシウム	300mg	過剰の胃酸を中和して、胃の痛み、胸やけ、胃酸過多などに効果をあらわします。
炭酸水素ナトリウム	300mg	
ソウジュツ乾燥エキス	60mg (薔苳600mgに相当)	胃の働きを調和する神経に作用して、過剰な胃酸の分泌を抑制し、胸やけなどに効果をあらわします。

添加物として、白糖、エリスリトール、還元麦芽糖水アメ、サッカリンNa、ポピドン、クエン酸、L-メントール、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）

(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



スクラルファートには3つの働きがあります。

- ① 傷ついた胃の粘膜を保護・修復する働き
- ② 過剰の胃酸を中和する働き
- ③ 胃液中のペプシンの活性を抑える働き

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03 (5412) 7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号