

■効能 飲みすぎ(過飲)、胃弱、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べすぎ(過食)、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胸やけ、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感

■用法・用量 成人(15才以上)1日2回、1回1瓶を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、15才未満は服用しないでください。●定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量 2瓶(60mL)中
ウルソデオキシコール酸 30mg、オウレン流エキス 0.2mL(原生薬換算量:200mg)、カンゾウ抽出粉末 50mg(原生薬換算量:714.5mg)、ケイヒ流エキス 0.8mL(原生薬換算量:800mg)、ゲンチアナエキス 60mg(原生薬換算量:300mg)、ショウキョウ流エキス 0.4mL(原生薬換算量:400mg)、ソウシュツ流エキス 0.5mL(原生薬換算量:500mg)、チンピエキス 200mg(原生薬換算量:1,000mg)、ニンジン流エキス 0.4mL(原生薬換算量:400mg)
添加物として、ウイキョウ流エキス、センブリ流エキス、精製白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、アルコール、水酸化Na、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、ポリリン酸Na、アルギン酸プロピレングリコールエステル、シメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、香料(*l*-メントール、バニリン、グリセリンを含む)を含有します。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号

Ⓔ

sato 第3類医薬品

飲みすぎによる二日酔い、
はきけ、むかつきに

薬草胃腸 内服液

ウルソデオキシコール酸

8種類の健胃生薬配合



発売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
電話 03(5412)7393

薬草胃腸内服液

30mL 第3類医薬品

使用上の注意

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。(5)本剤は生薬を配合していますので、成分が沈殿することがありますが、効果には変わりありませんので、よく振ってから服用してください。

ガラス:瓶 金属:キャップ



製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1