

アネロン内服液

乗物酔い薬

- アネロン内服液は、4種類の有効成分が、乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛といった症状の予防・緩和にすぐれた効果をあらわします。
- 水がなくてもその場で服用できる、爽やかな服用感の液剤です。
- 乗物酔いが起きてからでもすぐに服用すれば、乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛を緩和します。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 緑内障
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
循環器	動悸
その他	排尿困難

- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

効能・効果

乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には次の1回量を乗車船30分前に服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、4時間以上の間隔をおき1日3回を限度として服用してください。

年 齢	成 人 (15才以上)	15才未満
1回量	1瓶 (20mL)	×服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉 用法・用量を厳守してください。

成分と作用 1瓶 (20mL) 中

成 分	20mL中	作 用
塩酸メクリジン	25mg	刺激に対する内耳の感受性を低下させるとともに嘔吐中枢の興奮をおさえ、はきけ・めまいなどの症状をしずめます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	2mg	
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	10mg	消耗したビタミンB ₆ を補い、乗物酔いによるはきけをやわらげます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめるほか、他の薬剤の作用を高めます。

添加物として、デキストリン、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アルコール、塩酸、安息香酸Na、ℓ-メントール、香料を含有します。

乗物酔いしやすい方へのアドバイス

- バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないように気をつけましょう。
- 消化のよい食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
- 座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
- 窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりやゲームなどで気分をまぎらわしましょう。
- 乗物酔いの薬は、あらかじめ服用しておく方が効果的です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

製造販売元

同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2