



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。




鎮 痒 消 炎 薬

セロナ[®]ローション

しっしん、皮ふ炎、あせもに
酪酸ヒドロコルチゾン配合

セロナローションは…

- しっしん、皮ふ炎、あせもなどの炎症やかゆみに効果をあらわす、酪酸(らくさん)ヒドロコルチゾン配合したローションです。
- さらっとした透明なローションです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合



【効 能】

しっしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、患部に適量を塗布します。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

◎容器の使用法

●使用前

容器の先端を上に向けて、手の指で押して中の空気を抜いてください。(暑い時期、温度の高い場所などに置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、内圧が高まり、薬液が多くでることがありますので、これを防ぐためです。)



●使用中

患部に使用する時は容器を下向き又は斜めにして、患部に先端を軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと、薬液がでなくなります。)



《成分・分量と働き》

成 分	分 量	働 き
酪酸(らくさん) ヒドロコルチゾン	0.05W/V%	しっしん、皮ふ炎、かぶれなどの炎症を抑えます。

添加物として、イソプロパノール、クエン酸、クエン酸Na、グリセリン、ポビドンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5) 火気に近づけたり、火の中に入れたりしないでください。
また、使用済みの容器は火中に投じないでください。



◎お手当のアドバイス

1. 患部を清潔にしたのち、**セロナローション**のキャップをとり、容器の先端を患部にあて、胴部を軽く押すように塗布します。
2. 指先で強くこすらないように軽く塗布します。
3. 治りかけてきたら、回数をへらしてください。

〔注 意〕

患部がジュクジュクしている時に使用すると十分な効果が得られない場合があります。

そのような時は、油脂性基剤の**セロナ軟膏**をお使いください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
提携
Astellas Pharma International B.V.
(オランダ)

0807 8