

この説明文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

皮膚疾患治療薬

オイラックス®デキサS軟膏

オイラックスデキサS軟膏の特徴

- 副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルにより、しっしん、かぶれにすぐれた効果を発揮します。
- 鎮痒剤クロタミトンの作用によって、しっしん、かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
- 油性の基剤を使用していますので、じゅくじゅくした症状からカサカサの皮膚まで幅広く使用できます。また、患部を保護するはたらきもあります。
- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

しっしん、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん、ただれ、皮膚炎、しもやけ

使用法

1日数回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量


本剤は、白色～淡黄色半透明の軟膏で、1g中に次の成分を含有する。

デキサメタゾン酢酸エステル	0.25mg
クロタミトン	50mg
トコフェロール酢酸エステル	5mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg
添加物：ワセリン、サラシミツロウ、ステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ソルビタンセスキオレイン酸エステル	

塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
お願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋 3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋 3-14-10

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山市横越168