

Kracie

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ

かつ こん どう えき

かぜのひきはじめ、頭痛に



眠くなる成分は
入っておりません

1日2回

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ

カンポウ専科

眠くなる成分は
入っておりません


漢方製剤

1日2回 内服液 45mL
第2類医薬品

内服液
45mL×2本
(1日分)

第2類医薬品

漢方製剤



かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ

カンポウ専科

眠くなる成分は
入っておりません

漢方製剤

1日2回 内服液 45mL
第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

押して開ける

第2類医薬品

販売名:

クラシエ葛根湯液Ⅱ

△使用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
 - ① けい、排尿困難
 - ② 次の診断を受けた人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 - (9) 次の診断を受けた人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係機関 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 吐き気、食欲不振、嘔吐・便秘

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
血アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に重くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、尿色黄、全身のだるさ、食欲不発があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びビンラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) ビンをあけたら飲みきってください。
- (6) ビンをあけたまま保存しないでください。

発売元
クラシエ 薬品株式会社
東京都港区南青山2-20-20
ホームページ: www.kracie.co.jp
受付時間
10:00～17:00(土、日、夜を除く)

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋島等173
副作用や重篤な副作用の問合せ先
☎0120-149-931

製造
番号
使用
期限

御用金庫



0304