

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

パテックス®フェルビナク35

特長

- フェルビナクを1枚あたり35mg配合した消炎鎮痛テープ剤です。
- フェルビナクは痛みに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みに優れた効き目をあらわします。
- 伸縮性に優れているので、関節部などの可動部にも使用しやすく、肌にピツパリとフィットします。
- 基布の色がモカベージュなので、服の下でも目立ちません。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい
 - (1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03(6667)2323
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

®登録商標

製造販売元

ニプロパッチ株式会社
埼玉県春日部市南栄町8番地1

用法・用量

年齢	使用方法
15歳以上	表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

〈用法・用量に関連する注意〉 ●用法・用量を厳守して下さい ●本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい ●汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい ●皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい

成分(膏体100g中)

成分	含量	作用
フェルビナク	3.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物: l-メントール、ポリブテン、ステレン・インソレン・ステレンブロックコポリマー、ジブチルヘドロキシルトレン、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、その他2成分

[1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]

保管及び取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、袋の口を折りまげて保管して下さい
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)