

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

一 総合感冒薬 一 ジキニン<sup>®</sup>C

第2類医薬品

ジキニンCは、鎮咳剤ジヒドロコデインリン酸塩や解熱鎮痛剤アセトアミノフェン、鎮咳・去痰作用のある生薬カンゾウ（甘草）エキス、かぜで消耗しやすいアスコルビン酸（ビタミンC）などを配合した、かぜによる頭痛、発熱、のどの痛みなどによく効く、総合感冒薬です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
（眠気等があらわれることがある。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                         | 症 状                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>（アナフィラキシー）                            | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。        |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>（スティーブンス・ジョンソン症候群）、<br>中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。               |
| 肝機能障害                                         | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 間質性肺炎                                         | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |

〔裏面につづく〕

〔表面からのつづき〕

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                   |
| ぜんそく                | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                 |
| 再生不良性貧血             | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症               | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                           |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

かぜの諸症状(頭痛、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

## 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。 〈用法・用量に関連する注意〉

| 年 齢         | 1回量     | 1日服用回数 |
|-------------|---------|--------|
| 15才以上       | 1 包     | 3 回    |
| 11才以上 15才未満 | 2/3包    |        |
| 7才以上 11才未満  | 1/2包    |        |
| 3才以上 7才未満   | 1/3包    |        |
| 1才以上 3才未満   | 1/4包    |        |
| 1才未満        | 服用しないこと |        |

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成 分】 (1包1.5g中)

| 成 分                   | 分 量                    | 解 説                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| ジヒドロコデインリン酸塩          | 8 mg                   | 咳中枢に働き、せきを鎮めます。                 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩       | 20 mg                  | 気管支を拡張し、せきを鎮めます。                |
| アセトアミノフェン             | 300 mg                 | 発熱やのどの痛みを緩和します。                 |
| d-クロルフェニラミン<br>マレイン酸塩 | 1.17 mg                | アレルギーを抑え、鼻水、くしゃみを抑えます。          |
| アスコルビン酸               | 83.3 mg                | かぜで消耗しやすいビタミンです。                |
| L-アスコルビン酸ナトリウム        | 83.3 mg                |                                 |
| 無水カフェイン               | 25 mg                  | 頭痛を緩和します。                       |
| カンゾウ(甘草)エキス粉末         | 96 mg<br>(原生薬換算量750mg) | 生薬から抽出したエキスで、他の有効成分の働きをサポートします。 |

添加物としてタルク、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、白糖を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15  
<http://www.zenyaku.co.jp>