アレルギー性鼻炎などの鼻づまり・鼻みずでつらいときに

アルガード鼻炎のファルスプレーa

アルガード鼻炎クールスプレーaは、一定量の薬液がミクロの霧となり、鼻腔内の炎症部位に直接行きわたる噴霧治療薬。 花粉やホコリなどによるアレルギーが原因の鼻づまり・鼻みずを改善します。

特長1

鼻づまりなどのアレルギー症状で つらい時に効果的です

- ●血管収縮剤 塩酸テトラヒドロゾリンが充 血した鼻粘膜のはれを鎮め、鼻づまりを緩和 します。
- ●抗ヒスタミン剤 マレイン酸クロルフェニラ ミンが、花粉やホコリなどによるくしゃみ・鼻 みず等のアレルギー症状を緩和します。
- ●塩化ベンゼトニウムが鼻粘膜を清潔に保ち、 鼻づまりなどを緩和します。

特長2 スッキリした使用感

●清涼化剤 ℓ-メントール/ミントオイル配合 で、スッキリした使用感です。

特長3

液ダレしにくいミクロの霧が鼻腔の 奥まで届きます

- ●定量噴霧スプレー容器を採用し、押し方の 強さ・速さにかかわらず常に一定量の薬液 が鼻の奥の患部まで直接届きます。
- ●液ダレしにくい薬液が鼻腔内粘膜に長くと どまるので鼻粘膜をしっとりさせます。

特長4

やさしい使い心地

- ●炎症の起こった鼻腔内に刺激のないソフ トな使用感を実現するため、pH・浸透圧に も工夫しました。
- ●健康な鼻腔内pH(5.5~6.5)に近い弱 酸性処方となっています。

こんな時に お使いください

朝起き抜けの くしゃみ・鼻みずを 止めたいときに

日中眠くならずに 鼻みず・鼻づまりを 緩和したいときに

鼻がつまって 寝苦しいときに。

使用上の注意 🗘

してはいけないこと 💢



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こ りやすくなる)

長期連用しないでください。

相談すること



- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談くださ い。
- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の診断を受けた人

高加圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2.次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を 持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2)3日間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎 又は副鼻腔炎に よる次の諸症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻 汁過多)、くしゃみ、頭重

用法・用量

次の量を両鼻腔内に噴霧してください。

年齢	1回量	1日使用回数
7才以上	1~2度ずつ	6回まで (3~4時間ごとに)
7才未満	使用しないこと	

■用法・用量に関連する注意

- (1)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあるので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)点鼻用にのみ使用してください。



間関方法 あけ方 ツイストキャップを 手前にひねって ください。 しめ方 ツイストキャップを 音がするまで押し 下げてください。

有効成分 (100mL中)

有効成分	配合量
塩酸テトラヒドロゾリン	100mg
マレイン酸クロルフェニラミン	500mg
塩化ベンゼトニウム	20mg

添加物としてリン酸水素Na、リン酸二水素Na、等張化剤、 クロロブタノール、エタノール、ピーメントール、ハッカ油、 ポリンルベート80、グリセリン、CMC - Naを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- ※スプレーの先端を針等で突くのは、折れ た時大変危険ですので、絶対におやめく ださい。

お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、 またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。 「あなたに応えたい | サポートデスクです。

> 東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)