

2012年8月(*部
および記載要領変
更に伴う改訂)

手足のしびれ、
神経痛に

シビラック[®]

第3類医薬品

製品特徴

- 1.末梢神経の傷を修復し、
衰えた神経の機能を高
める「メコバラミン(活
性型ビタミンB12)」を主
成分として配合
- 2.手足のしびれ感、神経痛
に優れた効き目を発揮
- 3.末梢血行を改善するビ

タミンEも 配合してお
り、血行不良が原因の症
状にも効果的

- 4.服用しやすい1回1錠タイプ

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要な時に読め るよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ 側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名:シビラック メコバラミン主薬製剤

⚠ 使用上の注意

* **ⓧ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと

本剤または本剤の成分により アレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師または
登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発 疹
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感

2.服用後、次の症状があら われることがあるので、このような症状の持続または増強
が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相

談すること：軟便、下痢、便秘

3.1ヶ月くらい服用しても症
て医師、薬剤師または登録

4.服用後、生理が予定より
出血が長く続く場合は、医師、

状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持っ
販売者に相談すること

早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある
薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(3錠)中

成分	分量	はたらき
メコバラミン (活性型ビタミンB ₁₂)	1.5mg	末梢神経の傷を修復し、 神経の機能を高め、 神経の伝わりを整える
d- α -トコフェロール 酢酸エステル (天然型ビタミンE)	100mg	末梢の血行を改善し、 血行不良を原因とする 症状を改善する
フルスルチアミン塩酸塩 (ビタミンB ₁ 誘導体)	27.3mg (フルスルチアミン として 25mg)	神経機能を維持、改 善する
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	神経伝達物質の合 成を促す

添加物として、乳糖、ケイ酸Ca、セルロース、リン酸水素Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、白糖、アラビアゴム、タルク、酸化チタン、ケイ酸Al、リボフラビン、カルミン、カルナウバロウを含有する

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

 発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

日新製薬株式会社

〒994-0069 山形県天童市清池東2-3-1

MADE IN JAPAN

30002A

10119203

効能・効果

次の諸症状の緩和:手足のしびれ(しびれ感)、神経痛、腰痛、肩・首すじのこり「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること」

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとめること

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓してパッケージに入れて保管すること(本剤は光に対して弱い)(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと(5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること(6)乾燥剤は服用しないこと