Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒「クラシエ」

(ケイシカシャクヤクダイオウトウ)

特徴

- ●「桂枝加芍薬大黄湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒 論」に収載され、腹がはってしぶり腹に用いる「桂枝加芍薬湯」と いう処方に大黄を加えた薬方です。
- ●腹がはって、腹部膨満感や腹痛があり、便秘する方の便秘、しぶり 腹に効果があります。

⚠使用上の注意



() してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は 授乳を避けてください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4)高齢者
 - (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (6)次の症状のある人むくみ
 - (7)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- *3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください下痢
 - 4.1週間位(しぶり腹に服用する場合には5~6日間)服用して も症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持っ て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談 してください

効能

体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症: 便秘、しぶり腹

(注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものを指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数	
成人(15才以上)	1包	- 3回 -	
15才未満7才以上	2/3包		
7才未満4才以上	1/2包		
4才未満2才以上	1/3包		
2才未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて ください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。

桂枝加芍薬大黄湯エキス ……………………………1,700mg ケイヒ・タイソウ各2.0g、シャクヤク3.0g、ダイオウ・カンゾウ 各1.0g、ショウキョウ0.5gより抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい 新に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、 2日をすぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html な 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

A05

