

【効 能】 ●肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗
性疾患・産前産後などの場合の栄
養補給 ●滋養強壮 ●虚弱体質

【用法・用量】 15歳以上は1日1回
1ビン(80mL)を服用してください
●用法・用量を守ること(他のビタミン
等を含有する製品を同時に使用する
場合には過剰摂取等に注意すること)

金属
:キャップ
ガラス:瓶

80mL

4



【成 分】
1ビン(80mL)中
フルスルチアミン
塩酸塩
(ビタミンB₁誘導体)
.....5mg
リボフラビン...2mg
ピリドキシン塩酸塩
.....10mg
L-バリン.....80mg
L-ロイシン...160mg
L-イソロイシン
.....80mg
カルニチン塩化物
.....50mg

添加物:還元麦芽糖
水アメ、スクラロース、
ステビア抽出精製物、
クエン酸水和物、酒石
酸、DL-リンゴ酸、安息
香酸Na、パラベン、香
料、エタノール、プロピ
レングリコール、バニ
リン、pH調整剤

★本剤の服用により
尿が黄色くなること
がありますが、リボフ
ラビンによるもので
心配ありません



肉体疲労時の栄養補給に

アリナミン[®]R

フルスルチアミン+BCAA
(バリン・ロイシン・イソロイシン)配合

ノンカフェイン

製造販売元
武田薬品工業株式会社
大阪府中央区道修町四丁目1番1号
タケダ健康モバイルサイト <http://tkdm.jp>

香りさわやか

アリナミン[®]R

服用に際して、ビンの表示を必ず
読むこと

〔使用上の注意〕 相談すること

●次の場合は、直ちに服用を中止し、
このビンを持って医師または薬剤
師に相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合
皮膚:発疹、消化器:胃部不快感
2.しばらく服用しても症状がよくな
らない場合

●次の症状があらわれることがある
ので、このような症状の継続また
は増強が見られた場合には、服用
を中止し、医師または薬剤師に相
談すること 下痢

〔保管および取扱い上の注意〕

●直射日光の当たらない涼しい所に保
管すること ●小児の手のとどかない
所に保管すること ●使用期限を過ぎ
た製品は服用しないこと

お客様相談室 ☎ 0120-567087
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

使用期限

製造番号

D3