

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。
使用期限（パッケージおよびビンラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないこと

過剰にたまった
体脂肪を落とす

販売名：ビスラット ゴールド a

**ビスラット
ゴールド^a**

第2類医薬品

漢方製剤

製品特徴

- 特に体脂肪を減らしたい方、便秘がちな方に適した漢方薬です。
- 代謝を上げて、過剰にたまった体脂肪を落としていきます。
- 漢方処方の大柴胡湯の生薬を抽出した乾燥エキスを、服用しやすい錠剤にしました。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱などがあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれる

- (2) 1ヶ月位（常習便秘、高血圧に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
下痢



効能・効果

がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症：
肥満症、常習便秘、胃炎、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり

用法・用量

次の量を食前または食間に服用

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法・用量を守ること
- 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをよくしめること
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは・・・「食事と食事の間」を意味し、食後約2時間のことをいいます

成分・分量

1日量(12錠)中	大柴胡湯乾燥エキス・・・2.25g
＜原生薬換算量＞	
サイコ・・・3.0g	ハンゲ・・・2.0g
ショウキョウ・・・0.5g	オウゴン・・・1.5g
シャクヤク・・・1.5g	タイソウ・・・1.5g
キジツ・・・1.0g	ダイオウ・・・0.5g

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かぬところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3
MADE IN JAPAN

00000000