

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

乗りもの酔いに／酔ってからでも効く

センバアス 第2類医薬品
〈乗物酔い薬〉

◆センバアスは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにするための薬です。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください


他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります)



相談すること



① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき

効 能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。
乗物酔いの予防には乗車船の30分前に1回
1錠を服用します。なお、必要に応じて追加
服用する場合には、1回1錠を4時間以上の
間隔をおき服用してください。

年 令	1回量	服用回数
15才以上	1錠 	1日2回まで
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っている
PTPシートの凸部を指先で強く
押し、裏面のアルミ箔を破り、取
り出して服用してください。(誤っ
てそのまま飲み込んだりすると食
道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故
につながります)

〈錠剤の取り出し図〉



成 分

1錠中

成 分	分 量	はたらき
塩酸メクリジン	25mg	嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気をおさえます。

添加物：D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、香料、デキストリン、乳糖、黄色5号

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が
変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意ください



前夜は十分
な睡眠を
心がけま
しょう。



気分よく
すごしやす
い、前方の
席や窓際の
席を選びま
しょう。



飲みすぎや
食べすぎは
さけましょ
う。



適度なおしゃ
べりで気分
よくすごしま
しょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

連 絡 先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)