



ロバック[®]U

非ステロイド性湿疹・皮膚炎用薬

特 徴

第2類医薬品

- 非ステロイド性抗炎症剤ウフェナマートを主成分にかゆみを抑える成分を配合した外用剤です。
- 赤ちゃんからお年寄りまでお使いいただけます。
- のびがよくべとつかない白色のクリームです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3. 1～2週間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

おむつかぶれ、湿疹、皮膚炎、かゆみ、あせも、ただれ、かぶれ


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布すること。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。
- (4)用法・用量を厳守すること。

チューブ穴の開け方



キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。

(裏面へ続く)


成分 1g中

成分	含量
ウフェナマート	50mg
ジフェンヒドラミン	10mg
グリチルレチン酸	3mg

添加物：流動パラフィン、ワセリン、ステアリルアルコール、ベヘン酸、ジメチルポリシロキサン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、パラベン

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。



お手当てのアドバイス

- 薬を塗る前に、患部を清潔にしてください。
- 強くこすらないように注意し、指先で薄く塗布してください。
- 使用後は手(指についた薬)を洗いましょう。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
お願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号