



* 2011年12月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ロバック®Hi

ステロイド配合 湿疹・皮膚炎用薬

第2類医薬品

特 徴

- ヒドロコルチゾン酪酸エステルを配合した副腎皮質ホルモン(ステロイド)外用剤です。
- 湿潤剤としてヒアルロン酸ナトリウムを使用しています。
しっとりとなめらかな使用感がえられます。
- のびがよくべとつかない白色のクリームです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
- (2) 目や目の周囲。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん

(裏面へ続く)


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布すること。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 用法・用量を厳守すること。

チューブ穴の開け方



キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。


成分 1g中

成分	含量
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.5mg

添加物：ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、セトマクロゴール、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、パラベン、グリセリン、ヒアルロン酸Na、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。



お手当てのアドバイス

- 薬を塗る前に、患部を清潔にしてください。
- 強くこすらないように注意し、指先で薄く塗布してください。
- 使用後は手（指についた薬）を洗いましょう。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

● タケダ健康サイト（パソコン用）

<http://takeda-kenko.jp>

● タケダ健康モバイルサイト（携帯電話用）

<http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号