

外用鎮痛消炎薬(貼付剤) 第2類医薬品

バンテリン[®]新ミニパット

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

成分・分量(膏体100g中)

成分・分量	働 き
インドメタシン 1.0g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをとります。

[添加物] クロタミトン、メントール、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースNa、エステルガム、グリセリン、D-ソルビトール、カオリン、亜硫酸水素Na、エデト酸Na、ゼラチン、チモール、パルミチン酸デキストリン、流動パラフィン、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、乳酸

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫


用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を守ること。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること。(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用すること。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。(5) 連続して2週間以上使用しないこと。

上手な貼り方



まず、①のフィルムをゆっくりはがし、患部に貼ります。

次に、②のフィルムをはがしながら貼ります。

保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとして密封し、保管すること。(5) 使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く) 9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先:(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製 造 前田薬品工業株式会社 富山市向新庄町一丁目18-47

