ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。 また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第3類医薬品





アロエ鉛

「アロエ」はアフリカ大陸とマダガスカルなどが原産のユリ科の

植物です。ヨーロッパや中東などでは紀元前 から葉汁を集めて煮つめたものを薬として用 いていたようです。日本でも別名「医者いら ず」と呼ばれ古くからたいへん親しまれてい ます。

有効成分としてアンスロン配糖体の barbaloin、aloinoside A·B などが知られ ています。





⚠[使用上の注意]

してはいけないこと 💢



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の瀉下薬 (下剤)
- 2. 大量に服用しないでください。

相談すること



- 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、悪心・嘔吐
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤 師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症	状
消化器	はげしい腹痛、	悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
- 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が 見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。 下痢

(裏面もお読みください)

[成分] 1日量(9錠)中

添加物として、バレイショデンプン、セルロース、無水ケイ酸、カルメロースカルシウム、タルク、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

[効能・効果]

- ●便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和:

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常 醗酵、痔

[用法・用量]

次の1回量を食前に水またはお湯でかまずに服用してください。 ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の 具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年齢	1 回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	3 🛛
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ビンを この文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社