

■使用上の注意 相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

しばらく服用しても症状がよくなる場合

■成分・分量 1本(50mL)中

肝臓水解物…200mg

ウルソデオキシコール酸…15mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…4mg

添加物として、dl-リンゴ酸、エリスリトール、白糖、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、パラベン、デキストリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料、pH調整剤、アルコール(0.65mL以下)を含有します。

★本剤はリボフラビンリン酸エステルナトリウムを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。

■効能

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

■用法・用量

成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を服用します。

★定められた用法・用量をお守りください。

■保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

（2）小児の手の届かない所に保管してください。

（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）

（4）使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

お客様相談窓口

電話:03(5412)7393

受付時間:9:00～17:00

（土、日、祝日を除く）

ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度 0120-149-931

使用期限

製造番号

①