

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

フェイタス[®]シップ[®]温感

(販売名) フェルピナク配合シップ剤

12枚入
サイズ:10cm×14cm (6枚／1袋×2袋)
保湿チャック付

第2類医薬品



使用上の注意

❌してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1.次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3.連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、痛み、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として、患部に貼ってください。

《用法・用量に関連する注意》(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(6)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(7)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(8)打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
フェルピナク...0.7g トウガラシエキス...0.1g(原生薬換算1.25g)

添加物として、エドト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、ℓ-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5)開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室： ☎ **0120-133250**

受付時間： 9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先：(独)医薬品医療機器総合機構 ☎ **0120-149-931** <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

2B367T



4 987188 123225

フェイタス[®]シップ[®]温感

フェルピナク配合シップ剤

第2類医薬品

12枚入
サイズ:10cm×14cm
(6枚／1袋×2袋)



深く浸透 効いていく!

12枚入
サイズ:10cm×14cm
(6枚／1袋×2袋)

第2類医薬品

温感

フェイタス[®]シップ[®]

フェイタス[®]

腫痛に

、肩の痛み、

© 2015 Kura Pharmaceutical Co., Ltd.

フェルピナク配合シップ剤