

しみ・そばかす・日焼けによる色素沈着の緩和に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤(L-システイン配合)
ポポン[®]C ホワイト

 **シオノギ製薬**

しみ、そばかす、日焼けなどによる色素沈着は、紫外線などの影響で、メラニンが過剰に増えることによって起こります。

ポポンC ホワイトは、皮膚のメラニンに働いて、しみなどの色素沈着を緩和する働きをもつ主薬のビタミンCを中心に、皮膚の代謝に関わるL-システインとビタミンB₂、ビタミンB₆、末梢の血液循環をよくする天然ビタミンE(*d*- α -トコフェロール)を含んだのみやすい錠剤で、しみ・そばかす・日焼けなどによる色素沈着を緩和して、体の内側から、肌の健康を保ちます。



使用上の注意……

相談すること



1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい

下痢

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

……用法・用量……

次の量を食前または食後におのみ下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
小児(7才以上15才未満)	1錠	
乳幼児(7才未満)	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

ポポンCホワイトは、白色の糖衣錠で、6錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。


成 分	含量（6錠中）
アスコルビン酸カルシウム	847.28mg
（ビタミンCとして）	700mg
L-システイン	160mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	30mg
d-α-トコフェロール（天然ビタミンE）	20mg

添加物として 軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、精製白糖、タルク、アラビアゴム末、酸化チタン、カルナウバロウを含有しています。

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
- (2) 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。（ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい）
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨てて下さい。（本剤は糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意下さい）
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面の糖衣の一部が溶けて、斑点が生じることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用下さい。
- (9) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

……包 装……

ポポンCホワイト：90錠、180錠

®：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社

大阪府中央区道修町3丁目1番8号