Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

療方調血顆粒

(リョウホウチョウケツ)

特徵

- ●「療方調血顆粒」は、漢方では活血化瘀、緩消癥塊というはたらきがあります。
- ●のぼせや手足の冷えを伴う月経の痛み、しみ、肩こり、打ち身など に効果があります。

- / 使用上の注意・



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は 登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------|---|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。 |

- *3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、<u>この文</u> 書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
 - 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症: 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび





のぼせて足冷え

(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 1包 | |
| 15才未満7才以上 | 2/3包 | 30 |
| 7才未満4才以上 | 1/2包 | |
| 4才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて ください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。 桂枝茯苓丸エキス(1/2量) ………………1,150mg 「ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g」 より抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

また本剤は、生薬精油成分(においのする成分)を含んだエキスを使用しておりますので、漢方薬特有のにおいがします。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を 折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html ☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店 又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓□ ☎ (03) 5446-3334 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 クラシエ 製薬株式会社